



**THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING
FEDERATION**
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ALPINISME

Office: Monbijoustrasse 61 • Postfach
CH-3000 Berne 23 • SWITZERLAND
Tel.: +41 (0)31 3701828 • Fax: +41 (0)31 3701838
e-mail: office@uiaa.ch

STANOWISKO

KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH

CZĘŚĆ 5

Biegunka podróżnych – profilaktyka i leczenie w górach

Przeznaczone dla lekarzy, osób zainteresowanych,
operatorów wypraw trekkingowych i ekspedycji

Th. Küpper, V. Schoeffl, J. Milledge
2008

[tłumaczenie: Maciej Uchowicz, korekta: Paweł Podsiadło]

Wprowadzenie

Biegunka podróŜnych jest jednym z najwaŜniejszych problemów medycznych spotykanych na wyprawach trekkingowych i ekspedycjach górskich. ChociaŜ szczególowe dane wciąż s przedmiotem analizy, nie ma wtpliwoœci, Ÿe utrata pynów i elektrolitów znacząco upoœledza sprawnoœć fizyczną oraz psychiczną, a odwodnienie podwyższa ryzyko ostrej choroby górskiej (AMS, acute mountain sickness), zakrzepicy / zatorowoœci, odmrożeń oraz innych schorzeń zwizanych z wysokoœcią lub nisk temperatur. Dlatego kaŸda osoba przebywajca w górach "ma obowizek" unikania biegunki podróŜnych w najlepszy moŸliwy sposób oraz leczenia objawów. W przeciwieœnstwie do "normalnej" biegunki podróŜnych występujcej na poziomie morza, w œrodowisku wysokogórskim znaczne odwodnienie moŸe w konsekwencji przyczynić si do dodatkowego zwikszenia ryzyka, dlatego leczenie naleŸy rozpoczynać wczeœniej i powinno być ono bardziej "agresywne" niŸ w przypadku "zwykych" turystów odwiedzajcych oœrodk i wypoczynkowe i parki narodowe na niskich wysokoœciach.

Higiena / Odkazanie wody, patrz: Rekomendacja Komisji Medycznej UIAA nr 6!

Mikroorganizmy wywoujce biegunk podróŜnych

Istnieje wiele mikroorganizmów mogcych wywoać biegunk, naleŸcych co najmniej do jednej z czterech odmiennych grup organizmów: wirusów, bakterii, pierwotniaków i pasoŸytów. Dlatego brak jest "jednego i jedyne go" schematu profilaktyki biegunki podróŜnych. ChociaŜ na niektóre z patogenów istniej szczepionki (np. Ÿótaczk i typu A, polio, duru brzuszne go), w wikszoœci przypadków jedn szans zminimalizowania ryzyka stanowi róŸne sposoby utrzymania higieny osobistej i zbiorowej. Ale nawet w najlepszych warunkach, >75% uczestników wypraw popenia istotne pomyki w higienie (Ÿywnoœciowej).

Czynniki wpywajce na ryzyko

Ryzyko wystpienia biegunki podwyższa kilka czynników: wiek < 30 lat, odwiedzany rejon (np. biegunka podróŜnych w Alpach - ok. 4%, w Nepalu - do 80%), pora deszczowa, dugoœć pobytu, typ wyprawy ("wyprawa w nieznan", wyprawa wysokogórska), zmniejszona produkcja kwasów Ÿodkowych (blokery H₂, leki absorbujce kwas itp.), obniŸzona odpornoœć, cukrzyca lub wczeœniejszy pobyt w kraju rozwijajcym si przez > 6 miesicy. NaleŸy jednakŸe pamitać, Ÿe ryzyko dla konkretnej osoby jest wysoce zmienne. Niektóre obserwacje wskazuj, Ÿe stay pobyt w kraju rozwijajcym si przez > 6 miesicy zmniejsza ryzyko biegunki, być moŸe z powodu "uodpornienia" jelit.

Osoby z jednym lub wicej czynników powinny uzyskać indywidualn porad u lekarza specjalizujcego si w medycynie podróŜniczej.

Szczegón uwag i edukacj naleŸy kierować do kaŸdej osoby - podróŜnika lub czonka personelu miejscowego, majcych kontakt z Ÿywnoœcią. Podstawowe znaczenie ma higiena rk (mycie rk przed kontaktem z produktami!) i czyszczenie powierzchni lub wyposaŸenia (talerze, Ÿki, noŸe...) wchodzcych w stycznoœć z Ÿywnoœcią. Dobrym pomysem jest oddzielenie produktów misnych od warzyw,

owoców i jaj – każdy produkt, który może być zakażony mikroorganizmami patologicznymi należy trzymać oddzielnie.

Lista czynników ryzyka biegunki u osób podróżujących

1. Pożywienie

Bezpieczne	Względnie bezpieczne	Niebezpieczne lub niepewne
Gorące, długo przygotowywane (grillowane, gotowane, smażone)	Produkty suche	Sałaty
Fabrycznie przygotowane i zapakowane	Produkty hiperosmolarne (np. dżem, syrop)	sosy i “salse”
Warzywa i owoce gotowane (po obraniu)	Warzywa i owoce myte	owoce morza i zimne mięso niegotowane lub niedogotowane (np. salami), owoce nieobrane, produkty mleczne niepasteryzowane, zimne desery

2. Napoje

Bezpieczne	Względnie bezpieczne	Niebezpieczne lub niepewne
Napoje gazowane	Sok ze świeżych owoców	Woda ze źródeł lub studni (nieodkazona)
Fabrycznie przygotowana woda gazowana	Woda butelkowana (produkcji lokalnej)	Woda wodociągowa
Woda gotowana, kawa lub herbata	Lód, fabrycznie przygotowany i zapakowany	Kostki lodu lub lód pokruszony do napojów
Woda odkazona (patrz: Rekomendacja Komisji Medycznej UIAA nr 6)		Mleko niepasteryzowane lub niesterylizowane

3. Żywnienie zbiorowe

Bezpieczne	Względnie bezpieczne	Niebezpieczne lub niepewne
Dobrze znane restauracje o międzynarodowym standardzie	Domy prywatne, restauracje polecane jako "wysokiej klasy" w międzynarodowych przewodnikach	Uliczni sprzedawcy, bazary, restauracje polecane w przewodnikach jako "tanie"

Profilaktyka biegunki podróżnych

- Utrzymanie ścisłej higieny w odniesieniu do wody i utylizacji ludzkich produktów przemiany materii (patrz również: Rekomendacja Komisji Medycznej UIAA Nr 6)
- Utrzymanie ścisłej higieny osobistej
 - szczególnie: mycie rąk przed kontaktem z produktami żywnościowymi, wodą lub napojami
- Spożywanie napojów przygotowywanych na bazie wody pochodzącej wyłącznie z bezpiecznych źródeł (gotowanej lub odkażonej) lub bezpiecznych napojów fabrycznych
 - - ważna jest również higiena stomatologiczna!
- Unikanie niegotowanego mleka lub produktów mlecznych
- Mięso musi być dobrze wysmażone
- Unikanie sałat
- Owoce wyłącznie obrane
 - Obierane osobiście, w innym wypadku problem może pozostać nierozwiązany (nadal istniejące zagrożenie)
 - Uwaga: Niektóre owoce pozostają niebezpieczne, nawet po obraniu! Melony na przykład są sprzedawane na wagę. Po wstrzyknięciu wody przez szypułkę lub uschniętą część kwiatu, owoc będzie cięższy i dlatego droższy, ale wstrzyknięta woda jest niebezpieczna; woda i cukier zawarty w owocu jest najlepszym podłożem dla inkubacji bakterii, szczególnie jeśli owoc jest przechowywany na słońcu!
- Unikanie zimnych sosów lub produktów wytworzonych ze świeżych jajek bez gotowania
- Mycie naczyń, zastawy i garnków zawsze bezpieczną wodą
 - Przynajmniej końcowe czyszczenie. Jeśli bezpieczna woda jest problemem, do mycia podstawowego można użyć wody niebezpiecznej
 - Członek wyprawy, który ma biegunkę, może być niezdolny do kontynuowania wejścia / wyprawy. Nie wolno go prosić o przygotowywanie pożywienia lub pracę w kuchni dla powracających z wyjścia/ wspinania!

Uwaga! Powiedzenie “obierz, przygotuj i ugotuj lub zapomnij” nie gwarantuje bezpiecznego pożywienia! Ponieważ niektóre mikroorganizmy produkują toksyny, jakość produktów które będą gotowane jest bardzo ważna, niezależnie od sposobu obróbki. Lub, jak afrykańscy lekarze mówią mieszkańcom wioski: “Jeśli gotujesz gówno, będziesz jadł gotowane gówno!” (cytat z kursu zdrowia publicznego). **Należy upewnić się, że jakość każdego spożytego produktu (przetworzonego lub nie) jest dobrej jakości.** Warto pamiętać, że pięciogwiazdkowy hotel może mieć zerogwiazdkową kuchnię, jeśli nie ma w niej odpowiedniej infrastruktury przeznaczonej do mycia rąk przez personel. **Należy upewnić się, że każda osoba uczestnicząca w obróbce lub przygotowaniu pożywienia regularnie myje ręce przed kontaktem z pożywieniem lub wyposażeniem kuchennym oraz przed jedzeniem!** W wielu sytuacjach bezpieczna woda będzie występować w ograniczonej ilości. W takiej sytuacji, do oczyszczenia rąk, naczyń i zastawy można użyć chusteczki higieniczne nasączone środkiem odkażającym (po wstępnym oczyszczeniu niebezpieczną wodą).

Objawy biegunki podróżnych

- Początek: w większości przypadków występuje 3 dni po przybyciu (okres inkubacji od 6 godzin do kilku dni)
- Czas utrzymywania się objawów (nieleczonych): 3 -4 dni
 - 10% >1 tygodnia
 - 1% - biegunka przewlekła (> 3 tygodni)
- Przebieg choroby
 - Zapalenie żołądkowo – jelitowe / jelitowo – okrężnicze (większość przypadków)
 - Wodnista, w niektórych przypadkach śluzowa biegunka
 - Rozlany ból brzucha
 - Wymioty
 - Temperatura ciała do 38.5°C
 - **Uwaga:** odbijanie z przykrym smakiem, wzdęcia z przykrym zapachem z ust i nudności mogą wskazywać na infekcję **lamblia** (relatywnie częstą w Indiach i Nepalu). Sposoby leczenia: [1]: metronidazol 750-1000 mg/dzień przez 5 dni (3x 250 mg) lub tynidazol 2g w pojedynczej dawce u dorosłych. U dzieci ≥ 6 r.ż. 15-30 mg/kg/dzień w 2-3 dawkach przez 7 dni). Nie istnieje jeden lek zdolny do skutecznego wyleczenia wszystkich pacjentów z lamblia. Jeśli objawy utrzymują się, należy zastosować drugi lek.
 - Czerwonka (około 10% pacjentów)
 - stolec ropny lub krwisty
 - parcie na stolec
 - Gorączka do >40°C
 - W większości przypadków samowyleczalne!

Leczenie biegunki podróŜnych

- Nawodnienie!
 - Wcześnie rozpocząć, aby ograniczyć konsekwencje!
 - Około ¼ l na stolec (= 1 szklanka) dla dorosłych (dzieci: 1/2 szklanki)
 - Z wyjątkiem minimalnych objawów, nawodnienie należy uzupełnić elektrolitami (doustne preparaty nawadniające, ORS: tabela 1). **Uwaga:** niektóre komercyjnie dostępne produkty są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych! W przypadku stosowania u dzieci należy pamiętać o odpowiedniej dawce.
- Objawy umiarkowane
 - Nawodnienie plus
 - Loperamid
 - 1. dawka: 4 mg (2 kapsułki)
 - następnie 1 kapsułka po każdym płynnym wypróŜnieniu (nie więcej niż 12 mg/dzień lub ponad 48 godzin)
 - wyłącznie dla pacjentów w wieku > 8 lat (dla wieku 2-8 lat istnieje odpowiednia dawka)
- Objawy nasilone
 - Nawodnienie plus
 - Loperamid (patrz wyŜej) plus chinolon (np. ofloksacyna, 400 mg/d lub cyprofloksacyna, 500 mg/d)
 - **Uwaga:** Czestą przyczyną biegunki podróŜnych w Nepalu jest *Campylobacter*. W tym kraju oraz innych obszarach Azji południowo – wschodniej zalecana jest azytromycyna (500 mg 1x/d przez 3 dni). JeŜli ten antybiotyk nie da poŜądanego efektu, należy jako przyczynę należy rozwaŜyć mikroorganizmy niebakteryjne (zastosować metronidazol w schemacie opisanym powyŜej) lub zamienić na lewofloksacynę (500 mg/dzień przez 5 dni).
- Kontakt z lekarzem w następujących sytuacjach:
 - Gorączka >39°C
 - Wymioty nie ustające przez > 2 dni
 - Czerwonka (opis powyŜej)
 - Objawy utrzymujące się > 5 dni
 - CiąŜa
 - Małe dzieci (≤6-8 lat)
 - Osoba starsza (≥65 lat)
- Brak dalszego wchodzenia, aŜ do ustąpienia objawów i uzyskania pełnego nawodnienia pacjenta!

Składnik	zalecenie WHO	Substytut domowy
Sól stołowa	3.5 gr	1 łyżeczka soli stołowej
Dwuwęglan sodu	2.5 gr	½ łyżeczki proszku do pieczenia
Chlorek potasu	1.5 gr	1 banan
Glukoza	20.0 gr	4 łyżeczki
lub zwykły cukier	40.0 gr	8 łyżeczek

Tabela 1: Składniki do przygotowania 1 litra doustnego roztworu nawadniającego (ORS) ze sterylną wodą. Dawkowanie (po każdym luźnym stolcu): dzieci w wieku przedszkolnym (2-5 lat): 1 kubek, dzieci (6-12 lat): 2 kubki, młodzież i dorośli: 4 kubki. [objętość kubka – 250 ml]

Piśmiennictwo

1. Adachi, J.A., H.D. Backer, and H.L. DuPont, *Infectious diarrhea from wilderness and foreign travel*, in *Wilderness Medicine*, P.S. Auerbach, Editor. 2007, Mosby Inc.: St. Louis (Missouri, USA). p. 1418-1444.

Członkowie Komisji Medycznej UIAA (w porządku alfabetycznym)

C. Angelini (Włochy), B. Basnyat (Nepal), J. Bogg (Szwecja), A.R. Chioconi (Argentyna), S. Ferrandis (Hiszpania), U. Gieseler (Niemcy), U. Hefti (Szwajcaria), D. Hillebrandt (Wielka Brytania.), J. Holmgren (Szwecja), M. Horii (Japonia), D. Jean (Francja), A. Koukoutsis (Grecja), J. Kubalova (Republika Czeska), T. Kuepper (Niemcy), H. Meijer (Holandia), J. Milledge (Wielka Brytania), A. Morrison (Wielka Brytania), H. Mosaedian (Iran), S. Otori (Japonia), I. Rotman (Republika Czeska), V. Schoeffl (Niemcy), J. Shahbazi (Iran), J. Windsor (Wielka Brytania)

Historia niniejszych zaleceń

Wersja przedstawiona powyżej została zaakceptowana na spotkaniu Komisji w Adrspachu – Zdonovie (Republika Czeska) w 2008 roku.